

...a kutyák és macskák oltásairól

Kutyák oltási sora

-féreghajtás 3 és 5 hetesen

-6 hetes korban Parvo vírusos bélgyulladás elleni oltás, féreghajtás

-8 hetes korban kombinált oltás (szopornyica, Parvo, májgyulladás, parainfluenza), féreghajtás

-10 hetes korban kennelköhögés elleni oltás, féreghajtás

-12 hetes korban kombinált oltás (szopornyiva, Parvo, májgyulladás, parainfluenza, leptospirosis), féreghajtás

-14 hetes korban veszettség elleni oltás, féreghajtás **(kötelező)**

-16 hetesen Lyme-kór elleni védőoltás

-18 hetesen Lyme-kór elleni védőoltás ismétlése

-az 1. veszettséghez képest fél évre a veszettség oltás ismétlése, féreghajtás **(kötelező)**

-két hét múlva kombinált oltás ismétlése

-a 2. veszettség oltáshoz képest évente veszettség+kombinált oltás, féreghajtás **(a veszettség elleni oltást Magyarországon évente kötelező beadatni, de a kombinált oltás adása a javasolt, hogy kedvencünk védett legyen a fertőző betegségektől!)**

A féreghajtózást legalább negyedévente érdemes egyszerre az összes kedvencünkön elvégezni. Mi leginkább a havi rendszerességű féreghajtást ajánljuk, olyan szerrel, amely alkalmas a szívférgesség és a bőrférgesség megelőzésére (Milbemax, Advocate vagy Stronghold- mindhárom szer kapható rendelőkben).

Macskák oltási sora

1. Csak bent tartott macskák:

- macska leukémia és AIDS teszt a cica házhoz kerülésekor
- féreghajtás 3 és 5 hetesen
- 10 hetesen kombinált oltás (macska Parvo, macskanátha), féreghajtás
- 12 hetesen kombinált oltás ismétlése, féreghajtás
- 14 hetesen veszettség elleni védőoltás, féreghajtás
- 1 éves kor után évente: veszettség és kombinált oltás, féreghajtás

2. Kinti-benti macskák:

- macska leukémia és AIDS a cica házhoz kerülésekor
- féreghajtás 3 és 5 hetes korban
- 10 hetes korban kombinált oltás, féreghajtás
- 12 hetes korban leukémia elleni oltás negatív teszt esetén, féreghajtás
- 14 hetes korban kombinált+leukémia oltás ismétlése, féreghajtás
- 16 hetes korban veszettség elleni oltás, féreghajtás
- 1 éves kor után évente: kombinált, veszettség és leukémia elleni oltás, illetve féreghajtózás, melyet érdemes havonta elvégezni, legalább tavasztól őszig

Ezeken az oltásokon kívül a FIP (macskák fertőző hashártyagyulladás) elleni vakcinát kérésre beadjuk a cicáknak, de ennek hatékonysága jelenleg megosztja az állatorvtudományt.